

8

ROSA CAROLINA.

(CORYMBOSA)

R. (Carolina) Germinibus globosis pedunculisque sub-hispidis, petiolis pilosis subaculeatis, caulo glabro, aculeis supularibus sub-uncinatis, ficholis oblongo-lanceolatis, floribus corymbosis. Williams spec. 2, 1969, Pars. syn. 2, pag. 48.

R. Corymbosa. Enn. Berr. 4, pag. ni. Bosc; Nouv. Cours. 11, p. 248. Non Poiner, Enc. vol. 4. 2' part. sup. p. 715.

LE ROSIER DE LA CAROLINE.

(Var. à fleurs en corymbe).

DESCRIPTION.

Ce Rosier n'est qu'une variété du R. Caroliniana de Michaux, et c'est à tort que Williams von la présenté comme la véritable espèce (°).

Notre variété offre un arbrisseau de cinq à six pieds de haut, divisé en rameaux lisses, rougeâtres, munis, sur-tout à la base, de quelques aiguillons inégaux, épars, presque

(i) Le Rosier de Caroline différe de la variété dont nous donnons la figure, 1° par sa tige qui ne s'elève qu'à un pied et demi, ou deux pieds; a' par ses feuilles aigués coriacées, comme laisantes en-dessus, de la langueur de douze à quinze lignes au plus; 3° et entin par ses fleurs solitaires ou géminées. Rosser à donné une assez bonne figure de ce Rosier, nº 44. Il fait aussi partie de la collection d'à a due vis.

Le Rosser de Pengrisonie se rapproche de notre variété par ses fleurs en corymbe, mais il s'en éloigne par ses ovaires constamment gisbres, et ses petioles non épineux, seu-

En général ou doit dire qu'il existe de très-grands rapports entre le Rosier Canelle (Cinnamomea), le Rosier de Mai (Maialis), le Rosier de Caroline (Carolina), le Rosier de Pensylvanie Pensylvanica), et le Rosier à fieurs en carymbe (Carolina). Pent-être serait-il possible de réunir ces espèces, qui paraissent sortir de la même souche, pour n'en former qu'un seul groupe.



mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 |